



JIME – ALGAS

Bioestimulante Líquido Enriquecido con Macro y Micronutrientes

NRO REGISTRO

F-2025-3398

INFORMACIÓN GENERAL

Titular de Registro	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA JIMENEZ ROMERO JIMEAGROS S.A.
Fabricante	Qingdao Haidelong Biotechnology Co., Ltd. – Qingdao, China
Registro Agrocalidad	F-2025-3398
Contenido Neto	1 L – 1 GL – 20 L – 50 L – 208 L

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico / Apariencia	Líquido
Valor de pH	5.6
Densidad	1.08 g/ml
Solubilidad en agua	Completamente miscible en agua

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Concentración
Potasio (K_2O)	7.50 %
Zinc (Zn)	0.30 %
*Extracto de Algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	20.00 %

* Extracto de algas proveniente de *Ascophyllum nodosum*.

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA

Bioestimulante líquido formulado con extracto de *Ascophyllum nodosum* (20.00 %), fuente natural de citocininas, auxinas, giberelinas y betainas que activan los mecanismos de tolerancia al estrés abiótico (hídrico, salino y térmico) e incrementan la cuaja y uniformidad del fruto. El Potasio (K_2O : 7.50 %) y el Zinc (Zn: 0.30 %) complementan la función bioestimulante con nutrición mineral directa, optimizando la calidad y el rendimiento de la producción.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

Cultivo	Dosis	Época aplicación	Forma de Aplicación
Banano (<i>Musa acuminata</i>) Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) Café (<i>Coffea arabica</i>) Frutales Hortalizas Cítricos Flores y Ornamentales	1.0 – 2.0 L/Ha	Durante todo el ciclo del cultivo	Foliar y Edáfica (Drench / Fertirriego)

Modo de empleo: Coloque la dosis recomendada en el tanque con la mitad del volumen de agua, agite hasta homogenizar y complete el volumen requerido. Aplicar en horas de baja radiación solar (primeras horas de la mañana o últimas de la tarde). No aplicar si se prevén lluvias inmediatas.

GARANTÍAS DE CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Cumple con los límites máximos permitidos de metales pesados (Arsénico, Cadmio, Cromo Hexavalente, Mercurio, Níquel y Plomo), conforme a análisis de laboratorio acreditado.

Compatibilidad y almacenamiento: No presenta incompatibilidad con otros productos de uso agrícola. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a escala antes de aplicar en campo. Conservar en envase original herméticamente cerrado, en lugar fresco (5–35 °C), seco y alejado de niños y animales.