



JIME – ZINC

Fertilizante Inorgánico Enriquecido con Aminoácidos

NRO REGISTRO

F-2025-3565

INFORMACIÓN GENERAL

Titular de Registro	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA JIMENEZ ROMERO JIMEAGROS S.A.
Fabricante	Qingdao Haidelong Biotechnology Co., Ltd. – Qingdao, China
Registro Agrocalidad	F-2025-3565
Contenido Neto	1 L – 1 GL – 20 L – 50 L – 208 L

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico / Apariencia	Líquido
Valor de pH	3.73
Densidad	1.33 g/ml
Solubilidad en agua	Completamente miscible en agua

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Concentración
Zinc (Zn)	13.50 %
Azufre (S)	8.00 %
Aminoácidos Libres	2.00 %

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA

Fertilizante inorgánico líquido con Zinc (Zn: 13.50 %), Azufre (S: 8.00 %) y Aminoácidos libres (2.00 %). El Zinc es cofactor de más de 300 enzimas y esencial para la síntesis del Ácido Indolacético (AIA); su deficiencia provoca hojas pequeñas, entrenudos cortos y reducción significativa del rendimiento. El Azufre constituye aminoácidos azufrados (metionina y cisteína) y activa enzimas nitrogenasas. Los aminoácidos libres mejoran la absorción cuticular del Zinc y actúan como biostimulantes metabólicos.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

Cultivo	Dosis	Época aplicación	Forma de Aplicación
Banano (Musa acuminata) Cacao (Theobroma cacao) Café (Coffea arabica) Frutales Hortalizas Cítricos Flores y Ornamentales	1.0 – 2.0 L/Ha	Durante todo el ciclo del cultivo	Foliar

Modo de empleo: Coloque la dosis recomendada en el tanque con la mitad del volumen de agua, agite hasta homogenizar y complete el volumen requerido. Aplicar en horas de baja radiación solar (primeras horas de la mañana o últimas de la tarde). No aplicar si se prevén lluvias inmediatas.

GARANTÍAS DE CALIDAD, COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Cumple con los límites máximos permitidos de metales pesados (Arsénico, Cadmio, Cromo Hexavalente, Mercurio, Níquel y Plomo), conforme a análisis de laboratorio acreditado.

Compatibilidad y almacenamiento: No presenta incompatibilidad con otros productos de uso agrícola. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a escala antes de aplicar en campo. Conservar en envase original herméticamente cerrado, en lugar fresco (5–35 °C), seco y alejado de niños y animales.